

## **INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO Y PRESUPUESTO DE TRATAMIENTO DE DESENSIBILIZACIÓN CON HUEVO COCIDO**

### **Información general**

El tratamiento de desensibilización al huevo cocido consiste en la **inducción de tolerancia inmunológica al huevo cocido** en niños alérgicos a este alimento. Esto se realiza administrando un preparado comercial de huevo sometido a un proceso de cocción para desnaturalizar las proteínas, comenzando con dosis diminutas (una diezmilésima parte de una ración habitual) que se irán incrementando progresivamente a lo largo de varios días (previsiblemente treinta y siete) según una pauta establecida, hasta alcanzar una dosis de 40 ml, o la dosis máxima que su hijo/a tolere.

**La pauta** de desensibilización empleada **ya ha sido probada en nuestra clínica** mediante un ensayo clínico diseñado a tal fin (TRATAMIENTO DE DESENSIBILIZACIÓN EN PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA ALÉRGICOS A PROTEÍNAS DEL HUEVO COCIDO (CLOJ-2012/01)). En este ensayo, el porcentaje de éxito alcanzado (niños alérgicos al huevo que llegaron a tolerar 100 ml del preparado de huevo cocinado, equivalentes a un huevo cocido entero) fue alto, siendo superior al 80 %. El 14 % de los niños participantes toleró una dosis intermedia que les permitía tomar alimentos con ciertas cantidades de proteínas del huevo cocinadas (p. ej., bollería, repostería, pasta al huevo, etc.). El otro 6 % lo componen niños que debieron interrumpir el tratamiento antes de acabar la pauta por no tolerar los intentos repetidos de aumento de dosis y sin que se observase una mejora significativa en su umbral de tolerancia al huevo con respecto a su situación inicial.

Antes de empezar con la pauta de tratamiento, **es un requisito indispensable comprobar que su hijo/a sigue teniendo reactividad clínica con el huevo**. Para ello, se le practicarán pruebas alérgicas cutáneas y en sangre para determinar el grado de sensibilización a las proteínas del huevo. También podría ser necesario realizar una prueba de provocación controlada, en medio hospitalario, para determinar si sigue habiendo reactividad con la ingestión de huevo, y en dicho caso, la dosis que induce la reacción y que posteriormente guiará el seguimiento del paciente durante la pauta de tratamiento.

**La mayoría de las dosis** de la pauta de desensibilización **se administran en el domicilio del paciente**, salvo al menos cuatro dosis críticas que el niño/a viene a tomar a nuestra Clínica. La tolerancia a la dosis máxima para cada paciente se prueba en el Hospital. Durante todo el tratamiento, los padres disponen de una atención médica permanente mediante un teléfono de contacto de 24 horas, además de poder realizar las visitas necesarias en caso de ajustes individuales de la pauta.

Durante el tratamiento pueden ocurrir **efectos adversos** por la posibilidad de presentar **reacciones alérgicas de gravedad variable** con la administración del preparado de huevo, bien en el transcurso de las pruebas de provocación o bien en el transcurso del tratamiento de desensibilización. La intensidad de las reacciones alérgicas puede variar desde leve (p.ej. picor en la piel o garganta, leve sarpullido alrededor de la boca, etc.), pasando por

reacciones moderadas (rinoconjuntivitis, urticaria, asma) hasta reacciones graves (shock anafiláctico). En la alergia a alimentos también se han descrito, aunque rara vez, reacciones mortales tras la ingestión del alimento implicado. Cabe destacar que en nuestros estudios previos con huevo cocido y otros alimentos estas reacciones mortales no ocurrieron ni tampoco se registraron reacciones alérgicas graves. No obstante, cuando se trata de alergia a alimentos, siempre se deben considerar como un riesgo potencial.

En los últimos años, se han descrito casos aislados de presentación de **esofagitis eosinofílica** meses o años después de conseguirse la inducción de tolerancia a un alimento concreto. Se trata de una enfermedad alérgica que ocurre en el esófago (el tubo que conecta la garganta con el estómago) por el contacto con las proteínas del alimento implicado y que requiere ineludiblemente la retirada de ese alimento para su resolución.

El tratamiento contempla estos riesgos y se intentan minimizar de varias maneras: 1) realizando las pruebas de provocación en un ámbito hospitalario con disponibilidad de Unidad de Cuidados Intensivos y las administración de las primeras dosis de tratamiento en nuestra consulta; 2) adhiriéndose estrictamente a las pautas de administración de las dosis tanto de provocación como de tratamiento; 3) tratando de forma inmediata cualquier tipo de reacción; 4) indicando el tratamiento a realizar en el domicilio del paciente en caso de que se produjese una reacción en esa situación; 5) poniendo a disposición del paciente que realiza el tratamiento un **teléfono de atención de 24 horas de contacto directo con un médico del equipo**.

Cuando se comience con el tratamiento, los padres / tutores tendrán una cita con el médico responsable, quien les informará de todos los procedimientos y pasos a seguir, así como les instruirá en el reconocimiento y tratamiento de las posibles reacciones que pudiesen surgir en el domicilio. Además, se les entregará un cuaderno de seguimiento del tratamiento así como los kits de huevo específicos para este tratamiento.

**Presupuesto por los servicios prestados-vigencia para el año 2019 (precios en euros)**

<b>ACTO MEDICO</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>Asociación con descuento del 20% (1)</b>	<b>Seguro Médico (2)</b>
<b>Estudio preliminar</b>			
Historia clínica	140	115	s.b.
Pruebas alérgicas leche	45	35	s.b.
Análisis IgE (15€*4)	60	60	s.b.
Análisis IgG4 (20€*2)	40	40	s.b.
P. provocación	120	100	s.b.
total parcial	<b>405</b>	<b>350</b>	
<b>Tratamiento IOTE (un único pago o pagos fraccionados)</b>			
1er pago	225	180	225
2º pago	225	180	225
3er pago	225	180	225
4º pago	225	180	225
total parcial	<b>900</b>	<b>720</b>	<b>900</b>
<b>Finalización tratamiento</b>			
Pruebas alérgicas	45	35	s.b.
Análisis IgE (15€*4)	60	60	s.b.
Análisis IgG4 (20€*2)	40	40	s.b.
total parcial	<b>145</b>	<b>135</b>	
<b>total IOTE</b>	<b>1450</b>	<b>1205</b>	<b>900</b>

(1) Asociaciones de pacientes a las que la Clínica aplica una reducción del 20%

(2) s.b. = según el baremo pagado por la compañía aseguradora; la Clínica Ojeda factura directamente a la compañía, a excepción del tratamiento de desensibilización que el paciente abona a la Clínica.

<b>ACTO MEDICO</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>Asociación con descuento del 20% (1)</b>	<b>Seguro Médico (2)</b>
<b>Revisión a los 6 meses</b>			
Consulta de revisión	140	115	s.b.
Pruebas alérgicas	45	35	s.b.
<b>total</b>	<b>185</b>	<b>150</b>	
<b>Revisión a los 18 meses</b>			
Consulta de revisión	140	115	s.b.
Pruebas alérgicas	45	35	s.b.
Análisis IgE (15€*4)	60	60	s.b.
Análisis IgG4 (20€*2)	40	40	s.b.
<b>total</b>	<b>285</b>	<b>250</b>	

(1) Asociaciones de pacientes a las que la Clínica aplica una reducción del 20%

(2) s.b. = según el baremo pagado por la compañía aseguradora; la Clínica Ojeda factura directamente a la compañía, a excepción del tratamiento de desensibilización que el paciente abona a la Clínica.