

**INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE METACOLINA, TEST DE MANITOL  
Y TEST DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON ANTÍGENO**

Para la realización del test para el que Ud. está citado/a el día \_\_\_\_\_ es necesario que siga las siguientes normas:

1º. Si Ud. es fumador, **No fumar** desde la noche anterior

2º. Suspender los siguientes medicamentos, si estuviese tomando alguno de ellos:

-Broncodilatadores inhalados de acción corta **12 horas antes**  
(Salbutamol, Terbutalina)

- Corticoides inhalados (Budesonida, Beclometasona, Fluticasona, Mometasona)

-Broncodilatadores de larga acción (Formoterol, Salmeterol) **24 horas antes**  
- Teofilinas (Theodur, Vent-Retard, Theolair)

-Broncodilatadores de ultralarga acción (Indacaterol, Vilanterol) **72 horas antes**

- Antihistamínicos (consulte con nuestra Clínica) **5 días antes**

- Antidepresivos tricíclicos (Tryptizol, Nobritol, Anafranil, Deanxit...)  
**15 días antes**

- Antileucotrienos (Montelukast) **15 días antes**

- Ketotifeno (Zasten) **21 días antes**

Si tuviese alguna duda acerca de la necesidad de suspender alguna medicación que esté tomando, no dude en consultarnos.

3º. No haber presentado, al menos en las **4 semanas previas**, INFECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

4º. No haber recibido, al menos en las **4 semanas previas**, VACUNACIONES (antigripal, anticatarral, antitetánica...)

5º. Podrá venir habiendo desayunado o comido, evitando comidas copiosas. **No debe ingerir** en las horas previas café, té, chocolate ni bebidas de cola.

**En tales circunstancias (puntos 3º o 4º), llámenos para evaluar la conveniencia de cambiar la cita.**

Si necesitase consultar cualquier duda o anular o cambiar la cita, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono o del correo electrónico: [info@clinicaojeda.es](mailto:info@clinicaojeda.es)